

Tăierile la pomii fructiferi se fac, în general, în perioada de repaus, toamna după căderea frunzelor sau primăvara până la pornirea în vegetație. Tăierile sunt de mai multe feluri, în funcție de scopul urmărit: tăieri de formare a coroanei, tăieri de rod, tăieri de întinerire, tăieri în verde (utilitare).

Tipuri de taieri

Taierile de formare - se aplica pomilor tineri, de la plantare pana la intrarea pe rod. Scopul acestei taieri este formarea unei coroane simetrice. Mugurii din varful fiecărei ramuri cresc mult mai repede decât cei de la baza, așa că, cu cât scurțăm mai mult aceste ramuri, cu atât păstrăm pomul la o înălțime convenabilă.

Taierile de rarire și fructificare

Taierile de rarire și fructificare se aplica pomilor pe rod și urmăresc echilibrarea proceselor de creștere și rodire pe tot parcursul vieții pomului. Rodirea este tot mai abundentă de la an la an.

Taierea de rarire și fructificare se execută diferențiat în funcție de vârsta pomului, prezenta sau absenta rodului sau a creșterilor, particularități de creștere și rodire pe care le prezintă combinația soi – portaltui.

Taierile anuale

Prin aceste taieri și urmăresc reducerea încărcăturii excesive cu muguri a pomilor fructiferi și pentru a se stabili mărimea ramurilor și întreprunderea lor.

Taierile de vara

Pentru pomii fructiferi, pot fi aplicate și taierile de vara ce încep prin ruperea lastarilor cu creștere incomodă (mai-iunie), crescuți pe lemn destul de vechi și care, prin dezvoltare, pot deranja ramificațiile normale ale pomului. Ruperea cu mâna a acestor lastari se va face înainte ca aceștia să depășească 15-20 cm. La sfârșitul lunii iulie și începutul lui august, se va continua taierea de curățare pentru eliminarea ramificațiilor scurte care au format muguri terminali.

În cazul pomilor fructiferi care cresc puternic, dar au o producție redusă, se va efectua o taiere pentru iluminare începând cu mijlocul lunii august. Această taiere poate determina o linistire a creșterii mlăditelor și o creștere a producției pomului. Prin aceste taieri se înlătură părți întregi de crengi, chiar dacă pe ele se află și fructe. Această "taiere de august" se aplică cu succes cu condiția să înainte de ea să nu se fi executat altă taiere timp de cel puțin un an și jumătate.

Taierile anuale

Prin aceste taieri și urmăresc reducerea încărcăturii excesive cu muguri a pomilor fructiferi și pentru a se stabili mărimea ramurilor și întreprunderea lor.

Taierile de întreținere

Prin aceste taieri se urmăresc echilibrarea vegetației între baza și varf și pentru a lăsa lumina să patrundă în adâncimea coroanei. Stropirile se fac mult mai greu la pomii fructiferi care au coroana deasă, existând și riscul ca soluția cu care se stropesc să nu poată fi aplicată pe toate ramurile.

Taierile de fructificare

Sunt necesare pentru a menține pomii într-un echilibru fiziologic timp mai îndelungat. La pomii fructiferi aflați în plină rodire se urmăresc normarea încărcăturii cu muguri floriferi în raport cu potențialul acestor pomi.

Taierile de întinerire

Sunt recomandate atunci când coroana pomilor se reduce considerabil iar semischeletul se întinereste în majoritate. Taierea pomilor fructiferi trebuie făcută în perioada de repaus, eventual primăvara târziu dar numai în cazul în care pomii au suferit de ger, pentru a putea deosebi mugurii sănătoși de cei atinși de ger.

Taierile în verde


Se execută la unii pomi fructiferi : cires, piersic (timpuriu), după culesul fructelor. Aceste taieri vin în completarea unui ansamblu de lucrări fundamentale pentru pomii fructiferi, de care vor depinde recoltele viitoare (săpatul în jurul pomilor, varuitul, stropiri)

Formarea unei coroane se obține în 4-5 ani de la plantarea pomului, prin taieri propriu-zise, prin scurțări sau suprimări de ramuri sau prin diverse operații de modificare a poziției de creștere a ramurilor și lastarilor.

Taierea pomilor fructiferi trebuie să înceapă abia după terminarea gerurilor. În principiu, începutul lunii

martie este favorabil inceperii lucrarilor de taiere a pomilor. Taierea executata mai devreme pot slabi rezistenta la gerurile care mai pot surveni. Pomii care nu au fost supusi taierilor au rezistat mai usor gerurilor decat cei care au suportat actiuni de taiere inaintea aparitiei acestor geruri.

TAIEREA CORECTA A POMILOR



TAIEREA INCORECTA A POMILOR

